

31) GLUTAMINE: INIBITORE SGLT 2

Nei soggetti sani, la quantità di glucosio riassorbito nel rene attraverso i trasportatori SGLT1 e SGLT2 è uguale alla quantità di glucosio filtrato nei glomeruli.

12) VARIACIL: Bypassa l'effetto di primo passaggio, pratica e indolore, ideale per fumetti lipofili e da richiedere una somministrazione prolungata, ideale per fumetti eliminati velocemente dall'organismo.

SVANTAGGI: alcuni pazienti sono allergici ai coloranti che fanno parte del farmaco, i fumetti devono essere altamente lipofili, i coloranti possono causare effetti irritativi del farmaco al sito d'azione farmacologica, nei fumetti a base assorbita a basso dosaggio (ASSORBIMENTO LENTO E PROLONGATO)

13) ~~to~~ I bronchi si dilatano le costrizioni cardiache sono più forti e più frequenti le arterie cardiache e dei muscoli volubili si dilatano perdendo una maggiore quantità di sangue ai punti apicali, i vasi sanguigni periferici si contragono, le pupille si dilatano.

26) Precursori della dopamina. Dopo somministrazione per inalazione si ha un diminuito metabolismo nei tessuti periferici, diminuito metabolismo del tratto gastroenterostomiale, minori effetti collaterali non desiderati

21) Inibitori COX1 Acido acetil salicilico, Ibuprofene, Naprossene, Ketoprofene, Piroxicam
COX2: Nimesulide, ciclofene, Celecoxib, rofecoxib

F) Antagonisti competitivi: es. Naloxone: un antagonista competitivo per il recettore dell'oppioide (oppioide). Antagonisti non competitivi: il farmaco si lega al recettore in un punto diverso dell'oppioide e modifica il sito di interazione e l'oppioide che causa effetti minori per il recettore