

## Esercitazione psicometria prof. Primi

### Scale:

- Numero di televisori per appartamento → scala a rapporti.
- Quanti televisori sono presenti in ciascun appartamento? → risposta aperta.
- Marca dell'auto → scala nominale, domanda aperta.
- Opinione sulla pena di morte → categoria nominale, risposta dicotomica (favorevoli/contrari)
- Soddisfazione professionale → scala a intervalli (test con punteggio da -10 a 10).
- Denaro speso per le vacanze → scala a rapporti (domanda aperta) poi definisco le categorie.
- Libri letti → scala a rapporti
- Proprietà di immobili → categoriale
- Età → a rapporti, domanda aperta → poi posso avere anche un livello dicotomico, ma se parto da questo perdo delle informazioni. E' ordinale se lo suddivido in fasce; in questo modo posso vedere la frequenza per ogni categoria ma non la media perché la variabile non è più continua.
- Reddito → a rapporti. Poi: ordinale medio-basso, ordinale medio-alto; scala nominale dicotomica.
- Sesso → dicotomica nominale
- Residenza → nominale, domanda aperta.
- Temperatura → a intervalli.
- Gruppo sanguigno → categoriale
- Tempo di residenza → a rapporti
- Gravità della patologia → ordinale.**
- Diagnosi preliminare →
- Stima della durata della degenza → nominale dicotomica.
- Attitudine verso una materia → a intervalli (livello più alto); lo zero è arbitrario, misuro l'attitudine attraverso un test che è arbitrario. Con la scala ordinale la misuro in base al punteggio (attitudine bassa, media, alta) mentre con quella nominale dicotomica stabilisco un livello al di sopra/al di sotto di un certo valore.