

Ampelografia

1) Sangiovese


Cuneiforme, trilobata, seni inferiori poco pronunciati, seno peziolare a lira aperto (molto), denti pronunciati con margini rettilinei a base stretta, glabra, verde medio, poco spessa, piana, picciolo verde, glabro, corto e sottile, nervature versi(no pigmentazione antocianica, dimensione media foglia.



Viene confuso con il cilieggiolo!-> seno peziolare cilieggiolo è chiuso contrariamente a sangiovese, presenza di peli striscianti maggiore rispetto a sangiovese, lunghezza picciolo più lunga della nervatura centrale in cilieggiolo, picciolo più spesso.

2) cabernet sauvignon

Verde carico, lobi sovrapposti che creano impallinature rotonde, tutti i seni a bordi sovrapposti, bollosa, seno parzialmente sguarnito da un lato, denti molto larghi convessi a base larga stoncati, pagine inferiore aracnoidea/lanuginosa, picciolo striature antocianiche importanti fino all'inizio delle nervature, picciolo media lunghezza. Pentagonale, grandezza media, opaca, presenza di peli dritti sulle nervature



3) Chardonnay

Seno sguarnito su entrambi i lati , orbicolare, trilobata o intera, glabra, leggermente bollosa, denti poco pronunciati a base larga, picciolo glabro verde con striature rossastre di lunghezza media. Seni poco pronunciati, glabra, seno peziolare a U



4) Sauvignon blanc

Lebbo piegato a gronda, lobi sono sovrapposti nel seno peziolare, denti convessi a base larga con la presenza di un puntino sulla punta (mucronatura), abbastanza bollosità, opaca, verde chiaro, pagina inferiore è aracnoidea/lanuginosa con nervature pronunciate, picciolo con striature antocianiche abbondanti, trilobata.



5) Aleatico

Aspetto foglia vecchia, foglia fragile, glabra, pentalobata, verde scarico, pentagonale, seno peziolare a lira chiuso o sovrapposto, pagina inferiore glabra nervature non molto pronunciate, picciolo verde e glabro.

Grandezza media, denti irregolari con margini rettilinei o convessi, sottile, fragile, picciolo di media lunghezza.



6) Canaiolo nero

Abbondanza di peli cotonosi nella pagina inferiore (anche la pagina superiore può avere leggera presenza di eli aracnoidei), venature antocianiche punto peziolare e inizio nervature, picciolo striature antocianiche con presenza di peli. Bollosità, seno peziolare a V o a lira chiuso, ondulatura lembo, verde scuro, poco brillante, denti mediamente pronunciati.



7) Syrah

Poco bollosità (rispetto al merlot), verde chiaro, sottile, picciolo con scanalatura che non lo rende esattamente tondo verde con qualche sfumatura antocianica, lembo ondulato, pentagonale, medio grande, pentalobata, denti poco pronunciati, seno peziolare a U aperto.




8) Montepulciano

Lobi revoluti (molto contorta), seni profondi (soprattutto i superiori) sovrapposti, seni inferiori sono meno pronunciati ma creano forte distinzione tra i lobi, denti molto pronunciati appuntiti, pentagonale, lobi inferiori a U, picciolo medio e glabro, verde scura.



9) Merlot

Molto bollosa, verde scuro, molto spessa, seni pronunciati che creano lingua di suocera , seno peziolare abbastanza largo a lira o U (più aperto del Syrah), pentagonale, pentalobata, piegatura dei lobi a gronda, increspata, spessa, verde scuro, lembo ondulato, denti non molto pronunciati a base larga convessi.



10) Pinot

Orbicolare, trilobata o intera, seno a V chiuso o sovrapposto, denti poco pronunciati, glabra, pigmentazione antocianica alla base della pagina inferiore.



Rispetto allo Chardonnay il seno peziolare presenta il margine.

11) Vernaccia

Seno a V aperto, bollosità, denti molto pronunciati, reniforme (più larga che lunga), picciolo glabro e verde, denti molto pronunciati a base larga rettilinei, nervature ben pronunciate nella pagina inferiore.




12) Trebbiano toscano

Molto bollosa, depressioni sparse su tutta la foglia, grande, lembo ondulato, verde carico opaco, denti convessi a base larga, nervature più chiare, tende a ingiallire per fenotipo molto precocemente, picciolo verde, spesso e glabro.



13) Cilieggiolo

Seno a lira poco aperto, pentagonale, foglia grande, picciolo lungo e carnoso, pagina inferiore presenza di peli aracnoidei, verde scuro, nervatura centrale in trasversale fa un ginocchio (ginocchiatura).



14) Malvasia bianca lunga

Grandezza medio grande, verde medio intenso, pentagonale, lembo ondulato, ginocchiatura, abbastanza spessa, penta o epta lobata, più ondulato del cilieggiolo, seno peziolare più chiuso/ sovrapposto rispetto al cilieggiolo, striatura rossastra sul punto peziolare, pagina inferiore lanuginoso (cilieggiolo aracnoidea), peli dritti su nervature, picciolo abbastanza grosso, striature rossastre abbondanti (cilieggiolo verde)



15) Ansonica

Grandezza media, pentagonale, seni superiori molto pronunciati identificano i lobi, seno peziolare sovrapposto, depressioni in prossimità del punto peziolare, lobi molto sovrapposti (come cabernet, ma qui non ci sono fori regolari), pagina inferiore glabra o leggera presenza di peli, denti pronunciati prevalentemente convessi a base larga, verde abbastanza chiaro.



16) Vermentino

Rugosità, opacità, poco lucida (sembra invecchiata), pentagonale, medio grande, pentalobata, denti irregolari non molto pronunciati, colorazione antocianica nel punto peziolare, pagina inferiore presenza di nervature molto sporgenti e verdi con presenza di peli aracnoideo/lanugginoso, bollosità, peli striscianti su pagina superiore, picciolo verde

